

Японский (комариный) энцефалит



Острое инфекционное заболевание, передающееся через кровь при укусе зараженного комара.

Характеризуется

преимущественным

поражением вещества

головного мозга и мозговых оболочек. Для этого

заболевания характерна сезонность - весна и лето, что

связано с появлением большого количества комаров.



С момента заражения до появления первых признаков болезни проходит от 5 до 15 дней.

Заболевание начинается внезапно с бурно нарастающих общеинфекционных симптомов: слабости, повышение температуры тела, головной боли. При этом многие больные могут назвать точное время начала своего заболевания. Иногда встречаются двоение в глазах, снижение остроты зрения, расстройства речи.

Профилактика Японского энцефалита



К мерам, позволяющим предупредить заболеваемость японским энцефалитом в эндемических очагах, относят: защиту кожных покровов от укусов комаров, для чего применяют москитные сетки и защитную одежду, обработку открытых участков кожи репеллентами.



Специфическая профилактика осуществляется путем вакцинации.

Дети могут быть привиты, начиная с 1 года жизни.

Взрослому городскому населению эндемичных регионов (территории, где обитают зараженные комары) вакцинация, как правило, не требуется.

Вакцинация проводится гражданам, проживающим в

эндемических очагах и выезжающим туда лицам (эндемичные территории комариного энцефалита в Японии и Юго-Восточной Азии).

При первых симптомах необходимо сразу же обратиться за помощью к врачу

